Preocupante la quietud del

UNA CIFRA muy baja. Quizás, demasiado. Tal parece el número de temblores registrados en la región de Puerto Rico durante el recién finalizado mes de febrero.

Porque, con sólo ló sismos -ninguno de ellos oficialmente sentido -, el pasado mes se coloca en el lugar de menor estividad de entre los transcuerridos desde enero de 1996. Una cifra que refleja tranquilidad, desde luego. Pero también una cierta inquietad; ¿no resultara extensiva esta transcuista...» auré#

Anno Peo Stambal do Planto Pigo 14 0 Sismos habidos en los últimos O Rúmeiro de clamps habidos en cada uno de las zonas elsmicas (1 de marzo de 1996 a 26 de febrero de 1 3 Galler / B Kunn Der Ф ₹

sentido

oficialmente odnabora sismos, Huyo 16

reciente comportamiento sísmic orimer plano

Sirmies de Puerto Rico (de la Universidad que remite la Red Sirmies de Puerto Rico (de la Universidad de Puerto Rico, Recisto de Mayagúez), los referidos 16 temblores del mes de pertra aparecca originados denuto de una amplia frunja que va desde las costas del norte de la República Doministana phasas el área marritima y costera del norte de Puerto Rico, y la región de la ula de Anegada, en el extremo oriental de las Islas Virgenes.

cas que se ofrece en el mapa adjunto, 4 de los 16 temblores han situado su epiccatro en la región del norte; 3 sismos lo han hecho en las de la Republica Dominicana y dej Bloque de Islas Virgenes; y 2, se han ubirado en las de los 19 Norte, del Pasaje de Mona, y en la Caural. No ha habido utiquino en las nesantes siete regiones (Trinchlera de Puerto Rico, Cañón de Mona, Sambrero, Deprasión de Islas Virgenes, Nordeste, Surceste y Deprasión de Islas Virgenes, En concreto, y de acuerdo a la división en regiones sismi-

Con tal exigua suma, la distribución de los 477 terroblores habidos, en el ámbito local a lo largo de los últimos doce meses, queda como se muestra en el mapa que publicamos.

SE ADVERTE que sigue destarada la región del surceste (11 d sismos: un 24% del total), segunda de la de los 19 corte y de la de Sombrero. En último lugar permanece la región del nordeste (que incluye el area metropolitana), con sólo 2

A lo largo del pasado mes, no se ha producido ni un solo tembror en varios de los puntos habitualmente más activos. Y. por ende, más conflictivos de nuestro entorno. Es subido que el becho de que se registren numerosos tembrores en una determinada región no nupone, occasaria-

いるのでは

EL NOEVO D